



Wiskunde / PGA

2 VMBO

Lineaire verbanden

ConTeXt College





© 2024

Het auteursrecht op dit lesmateriaal berust bij Stichting Math4All. Math4All is derhalve de rechthebbende zoals bedoeld in de hieronder vermelde creative commons licentie.

Het lesmateriaal is met zorg samengesteld en getest. Stichting Math4All aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de module. Ook aanvaardt Math4All geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, voortkomend uit (het gebruik van) dit lesmateriaal

Voor deze module geldt een Creative Commons Naamsvermelding Niet Commercieel 3.0 Nederland Licentie. (zie <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0>).

Dit lesmateriaal is open, gratis en vrij toegankelijk lesmateriaal afkomstig van Stichting Math4All en is speciaal ontwikkeld voor het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs. Het lesmateriaal op de website www.math4all.nl is afgestemd op kerndoelen wiskunde, tussendoelen wiskunde en eindtermen voor de vakken wiskunde A, B en C. Dit lesmateriaal is mediumneutraal ontwikkeld en op diverse manieren te bekijken en te gebruiken. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen via info@math4all.nl. Ook houden we ons altijd aanbevolen voor suggesties, verbeteringen en/of aanvullingen.

Het lesmateriaal in dit katern is gebaseerd op het materiaal dat je kunt vinden op de Math4All website www.math4all.nl. In de tekst staan dan ook regelmatig verwijzingen naar die website. Waar je precies moet zijn op die website kun je zien in de kopregel van iedere pagina.

Ieder hoofdstuk bestaat uit een aantal paragrafen en wordt steeds afgesloten met een paragraaf *Totaalbeeld* waar de leerstof wordt samengevat en/of herhaald.

PGA

PGA staat voor 'probleemgestuurde aanpak'. Je werkt dan onder begeleiding van je docent in kleine groepjes aan wiskundige problemen en samen bouw je de theorie op en maak je er een overzicht van.

De PGA wordt ondersteund door verwerkings- en toepassingsopgaven waarmee je kunt nagaan of je de stof beheerst. Deze opgaven worden op drie niveaus aangeboden. De niveau aanduiding vind je terug in de marge.

- ★ het basale niveau, dat iedereen zou moeten behalen
- ★ ★ een iets pittiger niveau, waarin iets meer uitdaging zit en die je alleen hoeft te maken als je er genoeg tijd voor hebt
- ★ ★ ★ een bijzondere toepassing of een echt pittige opgave die je alleen maakt als de rest veel te gemakkelijk voor je was

1

Lineaire verbanden

1.1	Recht evenredig	6
1.2	Lineaire verbanden	12
1.3	Terugrekenen	19
1.4	Balansmethode	26
1.5	Ongelijkheden	33
1.6	Totaalbeeld	40

1.1 Recht evenredig

Inleiding

Steeds vaker zie je elektrische auto's rijden. Waar vroeger de benzinemotor gangbaar was, wordt die nu langzaam vervangen door een elektromotor.

Henk vraagt zijn moeder hoe het zit met de kosten voor de ritjes met hun nieuwe elektrische auto. Er hoeft niet meer te worden getankt, maar je rijdt er vast niet gratis mee.

Henk's moeder legt uit dat ook zo'n auto energie verbruikt, je moet hem opladen. Daarna verbruikt hij per gereden km (gemiddeld) een bepaalde hoeveelheid energie die je in kWh (kiloWattuur) uitdrukt. En elke kWh aan elektriciteit kost een bepaald bedrag. Zo reken je uit hoeveel cent aan energie de auto per gereden km verbruikt.



Figuur 1.1

Je leert in dit onderwerp

- formules en grafieken bij recht evenredige verbanden maken en gebruiken;
- de begrippen evenredigheidsconstante en hellingsgetal;
- van een formule en/of grafiek bepalen of er sprake is van een recht evenredig verband.

Voorkennis

- de begrippen formule, grootte, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;
- grafieken bij formules maken.



Aantekeningen

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.



Theorie

Om te onthouden

A large grid of graph paper with 20 columns and 30 rows, intended for taking notes on the theory of linear relationships.

Verwerken

Opgave 1.1

Mevrouw Willems krijgt een kilometervergoeding K voor de kilometers die ze voor haar werk met de auto aflegt. Ze krijgt € 0,19 per km. Noem het aantal werkkilometers per maand q .


- Stel de formule op voor K .
- Is K recht evenredig met q ? Waarom wel/niet?
- Hoe ziet de grafiek van K er uit?

Mevrouw Willems heeft berekend dat iedere gereden kilometer 12,5 cent aan brandstof kost.

- Zijn de brandstofkosten voor het werk ook recht evenredig met q ?

★ Opgave 1.2

Zuiver cilindervormige kaarsen branden gelijkmatig op: elk uur verdwijnt er (in theorie) evenveel kaarslengte. Hier zie je twee grafieken bij opbrandende kaarsen.




Figuur 1.2

- Welke van deze twee grafieken hoort bij een cilindervormige kaars en waarom?
- Is de kaarslengte recht evenredig met de brandtijd?
- Met hoeveel centimeter per uur brandt de cilindervormige kaars op?

★ Opgave 1.3

De prijs die je voor een rit met een taxi betaalt, hangt af van de afstand die je rijdt. Je ziet hieronder van drie taxibedrijven de grafiek van het verband tussen prijs p (in €) en gereden afstand s (in km).



Figuur 1.3

- Bij welke firma's betaal je alleen een bedrag per gereden km?
- Geef bij die twee taxibedrijven een formule voor p afhankelijk van s .
- Ook bij het derde taxibedrijf betaal je een vast bedrag per gereden km. Alleen berekenen zij ook nog voorrijkosten. Hoeveel bedragen die voorrijkosten?
- Hoe kun je aan de grafiek zien dat bij die derde firma de prijs p niet recht evenredig is met het aantal gereden km s ?

★ **Opgave 1.4**

Bij constante snelheid geldt: $s = v \cdot t$, waarin

- s de afgelegde weg in m is;
- v de snelheid in m/s is;
- t de tijd in s is.

- a Leg uit waarom de afgelegde weg bij constante snelheid recht evenredig is met de tijd.
- b Een voorwerp beweegt 20 s met een snelheid van 40 m/s. Hoeveel bedraagt zijn afgelegde weg?
- c Een voorwerp beweegt 20 s en legt daarin 700 m af. Met welke snelheid bewoog dit voorwerp?
- d Een voorwerp beweegt 1500 m met een snelheid van 60 m/s af. Hoe lang doet het daar over?

Toepassen

Henk's moeder heeft uitgerekend dat het rijden met haar elektrische auto € 0,07 per km kost.

Ze gaat daarbij uit van een verbruik van 18 kWh (kilo-Wattuur) per 100 km. De prijs voor elektriciteit is bij het oplaadpunt dat ze het meest gebruikt € 0,39 per kWh.

Henk rekt het bedrag per km hiermee zelf na.



Figuur 1.4

Opgave 1.5: Elektrische auto

Bekijk de gegevens die Henk's moeder gebruikt om de energiekosten per km uit te rekenen.

- a Reken na, dat zij gemiddeld ongeveer € 0,07 per gereden km verbruikt.
Henk's moeder rijdt vier dagen per week elke dag naar haar werk, 31 km heen en 31 km terug.
- b Hoeveel kost haar dat per week?
Voor een schatting van de totale ritkosten per jaar (R in euro) neem je aan dat die recht evenredig met het aantal gereden kilometers per jaar (a in km) zijn.
- c Waarom is dat een aanname?
- d Stel een formule op bij het verband tussen R en a .
- e Henk's moeder werkt normaal gesproken 180 dagen per jaar. Bereken de kosten voor het heen en weer reizen.
- f Is een onkostenvergoeding van € 0,19 per km voor de kilometers die iemand voor zijn werk rijdt dus zonder meer voordelig voor de automobilist? Licht je antwoord toe.

Antwoorden

- 1.1 a** $K = 0,19 \cdot q$
- b** Ja, want als q verdubbelt, dan verdubbelt ook K .
- c** Een rechte lijn door de oorsprong van het assenstelsel en bijvoorbeeld (100,19)
- d** Ja, de brandstofkosten zijn recht evenredig met q .
- 1.2 a** Grafiek II, want daar wordt de kaarslengte gelijkmatig (elk uur evenveel) minder.
- b** Nee, want de grafieken van de kaarslengte gaan niet door de oorsprong van het assenstelsel.
- c** 40 cm brandt op in 8 uur.
Dat is met 5 centimeter per uur.
- 1.3 a** Bij de firma's I en II.
- b** Firma I: $p = 1,20 \cdot s$ Firma II: $p = 0,60 \cdot s$
- c** € 6,00
- d** Als je twee keer zoveel kilometer aflegt, betaal je niet twee keer zoveel.
- 1.4 a** Omdat v een constante is.
- b** Vul de formule in: $s = 40 \cdot 20 = 800$ m.
- c** $700 = v \cdot 20$ geeft $v = \frac{700}{20} = 35$ m/s.
- d** $1500 = 60 \cdot t$ geeft $t = \frac{1500}{60} = 25$ s.
- 1.5 a** 18 kWh per 100 km is $18/100 = 0,18$ kWh/km.
Elke kWh kost 39 cent, dus wordt het bedrag $0,18 \times 0,39 = 0,0702$.
En dat is ongeveer € 0,07 per km.
- b** $4 \times 62 \times 0,07 = 17,36$ euro/week.
- c** Omdat je er van uit gaat dat deze berekende gemiddelde kosten per km het hele jaar ongeveer hetzelfde blijven, maar dat hoeft niet. De energieprijzen kan omhoog gaan, je rijgedrag kan veranderen (meer in de stad rijden of juist niet, etc.).
- d** $K = 0,07 \cdot a$
- e** $a = 180 \cdot 62 = 11160$ km, dus $R = 0,07 \cdot 11160 = 781,20$ euro/jaar.
- f** Nee, want er zijn meer kosten om rekening mee te houden, zoals wegenbelasting, onderhoud van de auto, verzekering, enz.

1.2 Lineaire verbanden

Inleiding

Natuurlijk zijn de energiekosten niet de enige kosten die je hebt als je over een eigen auto wilt beschikken. Je kunt zo'n auto bijvoorbeeld *leasen*. Dat betekent: je krijgt de auto in gebruik, maar hij is eigendom van een leasebedrijf. Je betaalt dan een vast bedrag per maand waar alles bij in zit (aanschaf, onderhoud, etc.). Die maandelijkse kosten komen bij de energiekosten. Henk slaat aan het rekenen...



Figuur 2.1

Je leert in dit onderwerp

- formules en grafieken bij lineaire verbanden maken en gebruiken;
- de begrippen hellingsgetal en startgetal;
- bij een lineaire grafiek een formule opstellen.

Voorkennis

- rekenen, ook met negatieve getallen;
- de begrippen formule, grootte, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;
- recht evenredige verbanden herkennen en de evenredigheidsconstante, het hellingsgetal, bepalen;
- formules en grafieken bij recht evenredige verbanden maken en gebruiken.



Aantekeningen

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.



Theorie

Om te onthouden

A large grid of graph paper with 20 columns and 30 rows, intended for taking notes on the theory of linear relationships.

Verwerken

★ Opgave 2.1

Voor het verbruik van water betaal je twee soorten kosten:


- een vast bedrag per jaar, het vastrecht
- een bedrag per m^3 water die je verbruikt

In een bepaald gebied is het vastrecht € 36 en het bedrag per m^3 € 1,80. Noem de totale kosten per jaar K (euro) en het verbruik v in m^3 .

- Leg uit dat er sprake is van een lineair verband tussen K en v .
- Maak een tabel voor K afhankelijk van v .
Neem $v = 0, 50, 100, 150, 200$.
- Teken de grafiek van K .
- Geef een formule en een rekenschema voor de kosten afhankelijk van het waterverbruik.
- Bereken de kosten voor een waterverbruik van 120 m^3 .

★ Opgave 2.2

Je ziet drie grafieken die elk een verband tussen de variabelen x en y weergeven.



Figuur 2.2

- Bij welke van deze grafieken is y recht evenredig met x ?
 - grafiek I
 - grafiek II
 - grafiek III
- Hoe groot is bij die grafiek het hellingsgetal?
- Bij welke van deze grafieken is het hellingsgetal negatief?
 - grafiek I
 - grafiek II
 - grafiek III

★ Opgave 2.3

Hoe hoger je in de bergen komt, hoe lager de temperatuur wordt.

In een zeker berggebied geldt bij benadering: $T = 20 - 6 \cdot h$.

Hierin is:


- T de temperatuur in $^{\circ}\text{C}$ (graden Celsius)

- h de hoogte boven de zeespiegel in km
- a Welke temperatuur zou iemand op zeespiegelniveau dan ervaren?
- b Teken een grafiek van T afhankelijk van h .
- c Laat met een rekenschema zien, dat bij een hoogte van $3\frac{1}{3}$ km de temperatuur $0\text{ }^\circ\text{C}$ is.

★★ **Opgave 2.4**

Zuiver cilindervormige kaarsen branden gelijkmatig op. Je ziet de grafieken van de lengte L in centimeters van twee van die kaarsen afhankelijk van de brandtijd t in uren.

- a Welke grafiek hoort bij de dikste kaars? Licht je antwoord toe.
 - A. grafiek I
 - B. grafiek II



Figuur 2.3

- b Waarom is er bij beide grafieken sprake van een lineair verband?
- c Bekijk grafiek I en bepaal het hellingsgetal en het startgetal bij het verband tussen L en t . Stel ook de bijpassende formule op.
- d Bekijk grafiek II en bepaal hoeveel deze kaars elke 6 uur korter wordt. Bereken daarmee het hellingsgetal en stel de bijbehorende formule op.
- e Welke van beide kaarsen is na 4 uur branden het langst?

Toepassen

Henk's moeder leest haar elektrische auto voor € 360 per maand. Omdat ze heen en weer naar haar werk rijdt (dat is 62 km per dag, vier dagen in de week), legt ze maandelijks flink wat kilometers af. Elke km kost haar gemiddeld € 0,07.



Figuur 2.4

Ze krijgt van haar werkgever een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km.

Henk is nieuwsgierig of zijn moeder daarmee haar reiskosten compleet vergoed krijgt.

Opgave 2.5: Autokosten en reiskostenvergoeding

Bij **Toepassen** zie je welke kosten en welke vergoeding Henk's moeder heeft. Noem haar werkkilometers a , haar maandelijkse kosten voor de auto K en haar maandelijkse vergoeding voor de reiskosten R .

- a Stel een formule op voor K afhankelijk van a .
- b Stel een formule op voor R afhankelijk van a .
- c Bij welk van beide formules is sprake van een recht evenredig verband?
- d Teken de grafieken bij beide formules in één figuur.
- e Bereken hoeveel Henk's moeder maandelijks aan autokosten voor het werk heeft en hoeveel haar maandelijkse reiskostenvergoeding is. Komt ze ermee uit?
- f Vanaf hoeveel km per maand voor het werk zou ze wel uit de kosten komen?


Antwoorden

2.1 a Omdat je naast een vast bedrag per jaar een vast bedrag per m^3 betaalt.

b Zie de tabel.

verbruik v (m^3)	0	50	100	150	200
kosten K (euro)	36,00	126,00	216,00	306,00	396,00

c Zie de figuur.



d Formule: $K = 1,80 \cdot v + 36$ of $K = v \cdot 1,80 + 36$.

Rekenschema: $v \rightarrow [\cdot 1,80] \rightarrow \dots \rightarrow [+36] \rightarrow K$

e $v = 120$ geeft $K = 120 \cdot 1,80 + 36 = 252$, dus de kosten zijn € 252,00.

2.2 a B


b 0,5

c C

2.3 a Dan is $h = 0$ en dus $T = 20$ °C.

b Zie de tabel.

hoogte h (km)	0	1	2	3	4
temperatuur T (°C)	20	14	8	2	-4



c De formule kun je schrijven als $T = -6 \cdot h + 20$.

Rekenschema: $h \rightarrow [\cdot -6] \rightarrow \dots \rightarrow [+20] \rightarrow T$.

$3\frac{1}{3} \rightarrow [\cdot -6] \rightarrow -20 \rightarrow [+20] \rightarrow 0$

2.4 a B

b Beide grafieken vormen een rechte lijn, ieder uur brandt er evenveel van de kaars op.

c Bij grafiek I kun je aflezen dat het startgetal 30 en het hellingsgetal $\frac{-30}{10} = -3$ is.

Grafiek I: $L = 30 - 3 \cdot t$.



- d** Grafiek II wordt elke 6 uur 10 cm korter, dus het hellingsgetal is $\frac{-10}{6} = -1\frac{2}{3}$.

Grafiek II: $L = 25 - 1\frac{2}{3} \cdot t$.

- e** Grafiek I: $L = 30 - 3 \cdot 4 = 18$ cm.

Grafiek II: $L = 25 - \frac{5}{3} \cdot 4 = 18\frac{2}{3}$ cm.


Dus kaars II is dan het langst.

2.5 a $K = 0,07 \cdot a + 360$

b $R = 0,19 \cdot a$

- c** Alleen bij de formule voor R , want als $a = 0$ is ook $R = 0$.

- d** Maak eerst een tabel met $a = 100, 200, 300, \dots$



- e** Reiskilometers per maand: $a = 16 \cdot 62 = 992$ km (voor een maand van precies vier weken met elk vier werkdagen).

Kosten: $K = 0,07 \cdot 992 + 360 = 429,44$.

Vergoeding: $R = 0,19 \cdot 992 + 360 = 188,48$.

Ze komt dus lang niet uit de kosten, maar de auto zal ook voor andere zaken worden gebruikt.

- f** Zie de grafiek, ze moet dan 3000 km of meer voor haar werkgever rijden.

1.3 Terugrekenen

Inleiding

Henk's moeder houdt goed bij hoeveel ze maandelijks aan kosten voor de auto kwijt was. Behalve de kosten voor het leasen van de auto, houdt ze ook elke maand het aantal gereden km bij. Het leasen kost € 360 per maand en ze rekent € 0,07 per gereden km. Zo berekent ze de kosten per maand.

Van een bepaalde maand is ze haar berekening kwijt. Alleen het eindbedrag € 537,94 staat er nog. Hoeveel km heeft ze die maand gereden?



Figuur 3.1

Je leert in dit onderwerp

- het begrip lineaire vergelijking, en vergelijkingen grafisch oplossen;
- rekenschema's bij lineaire verbanden maken en deze gebruiken om vergelijkingen op te lossen door terugrekenen.

Voorkennis

- rekenen, ook met negatieve getallen;
- de begrippen formule, grootte, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;
- lineaire verbanden herkennen en het hellingsgetal en het startgetal bepalen;
- formules en grafieken bij lineaire verbanden maken en gebruiken.



Aantekeningen

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.



Theorie

Om te onthouden

A large grid of graph paper with a light green background and a light gray grid pattern, intended for taking notes.

Verwerken

★ Opgave 3.1

Voor het verbruik van water zijn in een bepaald gebied de totale kosten per jaar gegeven door:

$$K = 1,80 \cdot v + 36$$

waarin:

- K de totale kosten per jaar in euro
- v het verbruik in m^3

In een bepaald jaar bedragen voor een gezin in dat gebied de kosten € 277,20.

- Hoeveel water heeft dit gezin dat jaar verbruikt?
- Als de kosten een jaar later 1,5 keer zo hoog zijn, hebben ze dan ook 1,5 keer zoveel water verbruikt? Licht je antwoord toe met een berekening.

★ Opgave 3.2

Los de volgende vergelijkingen op:

- $3 \cdot x + 400 = 610$
- $0,32 \cdot p + 56 = 70$
- $10 \cdot k - 120 = 80$
- $-2,5 \cdot t + 120 = 80$


★ Opgave 3.3

Hoe hoger je in de bergen komt, hoe lager de temperatuur wordt.

In een zeker berggebied geldt bij benadering: $T = 20 - 6 \cdot h$.

Hierin is:

- T de temperatuur in $^{\circ}\text{C}$ (graden Celsius)
- h de hoogte boven de zeespiegel in km



Figuur 3.2

Je ziet, dat op zekere hoogte de temperatuur onder het vriespunt komt.


- Laat met een berekening zien op welke hoogte dat is.
- Bereken ook op welke hoogte de temperatuur -5°C is.

★★ Opgave 3.4

Zuiver cilindervormige kaarsen branden gelijkmatig op. Je ziet de grafieken van de lengte L in centimeters van twee van die kaarsen afhankelijk van de brandtijd t in uren.

Kaars I: $L = 30 - 3 \cdot t$.

Kaars II: $L = 25 - 1\frac{2}{3} \cdot t$.



Figuur 3.3

- a Na hoeveel tijd is kaars I nog 12 cm lang?
- b Na hoeveel tijd is kaars II nog 12 cm lang?
- c Welke betekenis heeft de vergelijking $30 - 3 \cdot t = 25 - 1\frac{2}{3} \cdot t$ hier?
- d De vergelijking bij c kun je op dit moment alleen oplossen met behulp van de grafiek. Lees uit de grafiek de oplossing af.

Toepassen

Henk's moeder leest haar elektrische auto voor € 360 per maand. Omdat ze heen en weer naar haar werk rijdt (dat is 62 km per dag, vier dagen in de week), legt ze maandelijks flink wat kilometers af. Elke km kost haar gemiddeld € 0,07.



Figuur 3.4

Henk is nieuwsgierig hoeveel km zijn moeder rijdt buiten haar ritjes van en naar het werk. Omdat ze maandelijks bijhoudt hoeveel haar autokosten bedragen, kan Henk dat narekenen.

Opgave 3.5: Autokosten

Bij **Toepassen** zie je welke kosten Henk's moeder voor haar auto heeft. Noem je haar maandelijkse kilometers a en haar maandelijkse kosten voor de auto K , dan is $K = 0,07 \cdot a + 360$.

- a In de maand mei heeft ze aan autokosten € 613,47 opgeschreven. Hoeveel km heeft ze die maand gereden?
Van haar werkgever krijgt ze € 0,19 per km vergoed.
Ze heeft in mei voor haar werk alleen heen en weer naar haar kantoor gereden (elke dag 62 km). Ze kreeg die maand een vergoeding van € 223,82.
- b Hoeveel dagen is ze naar haar werk geweest?

Antwoorden

- 3.1 a** Rekenschema: $v \rightarrow [\cdot 1,80] \rightarrow \dots \rightarrow [+36] \rightarrow K$.
Terugrekenschema: $v \leftarrow [/1,80] \leftarrow \dots \leftarrow [-36] \leftarrow L$.
Dit geeft $v = (277,20 - 36)/1,80 = 134 \text{ m}^3$.
- b** $1,5 \cdot 277,20 = 415,80$.
Dit geeft $v = (415,80 - 36)/1,80 = 211 \text{ m}^3$.
Maar $1,5 \cdot 134 = 201 \text{ m}^3$. Dus ze hebben dan meer dan 1,5 keer zoveel water verbruikt.
- 3.2 a** Rekenschema: $x \rightarrow [\cdot 3] \rightarrow \dots \rightarrow [+400] \rightarrow 610$.
Terugrekenschema: $x \leftarrow [/3] \leftarrow 210 \leftarrow [-400] \leftarrow 610$.
Dit geeft $x = 210/3 = 70$.
- b** Rekenschema: $p \rightarrow [\cdot 0,32] \rightarrow \dots \rightarrow [+56] \rightarrow 70$.
Terugrekenschema: $p \leftarrow [/3] \leftarrow 14 \leftarrow [-56] \leftarrow 70$.
Dit geeft $p = 14/0,32 = 43,75$.
- c** Rekenschema: $k \rightarrow [\cdot 10] \rightarrow \dots \rightarrow [-120] \rightarrow 80$.
Terugrekenschema: $p \leftarrow [/10] \leftarrow 200 \leftarrow [+120] \leftarrow 80$.
Dit geeft $p = 200/10 = 20$.
- d** Rekenschema: $k \rightarrow [\cdot -2,5] \rightarrow \dots \rightarrow [+120] \rightarrow 80$.
Terugrekenschema: $p \leftarrow [/10] \leftarrow -40 \leftarrow [-120] \leftarrow 80$.
Dit geeft $p = -40/-2,5 = 16$.
- 3.3 a** Dan is $T = 0$ en dus $20 - 6 \cdot h = 0$ ofwel $-6 \cdot h + 20 = 0$.
Rekenschema: $h \rightarrow [\cdot -6] \rightarrow \dots \rightarrow [+20] \rightarrow T$.
Terugrekenschema: $h \leftarrow [/ -6] \leftarrow \dots \leftarrow [-20] \leftarrow T$.
Dit geeft $h = (0 - 20)/-6 = 3\frac{1}{3} \text{ km}$.
- b** Vergelijking $-6 \cdot h + 20 = -5$.
Rekenschema: $h \rightarrow [\cdot -6] \rightarrow \dots \rightarrow [+20] \rightarrow -5$.
Terugrekenschema: $h \leftarrow [/ -6] \leftarrow -25 \leftarrow [-20] \leftarrow -5$.
Dit geeft $h = (-25)/-6 = 4\frac{1}{6} \approx 4,167 \text{ km}$.
- 3.4 a** Rekenschema: $t \rightarrow [\cdot -3] \rightarrow \dots \rightarrow [+30] \rightarrow T$.
Terugrekenschema: $t \leftarrow [/ -3] \leftarrow \dots \leftarrow [-30] \leftarrow T$.
Dit geeft $t = (12 - 30)/-3 = 6$ uur.
- b** Rekenschema: $t \rightarrow [\cdot -1\frac{2}{3}] \rightarrow \dots \rightarrow [+25] \rightarrow T$.
Terugrekenschema: $t \leftarrow [/ -1\frac{2}{3}] \leftarrow \dots \leftarrow [-25] \leftarrow T$.
Dit geeft $t = (12 - 25)/-1\frac{2}{3} = 7,8$ uur, dat is 7 uur en $0,8 \cdot 60 = 48$ minuten.
- c** Daarmee kun je de waarde van t bepalen waarbij de lengtes van beide kaarsen hetzelfde zijn.
- d** Ongeveer $t = 3,5$ uur. Daar zit het snijpunt van beide lijnen.
- 3.5 a** Rekenschema: $a \rightarrow [\cdot 0,07] \rightarrow \dots \rightarrow [+360] \rightarrow K$.
Terugrekenschema: $a \leftarrow [/0,07] \leftarrow \dots \leftarrow [-360] \leftarrow K$.



Dit geeft $a = (613,47 - 360)/0,07 = 3621$ km.

b De reiskostenvergoeding is $0,19 \cdot a = 223,82$.

Terugrekenen: $a = 223,82/0,19 = 1178$ km. Dat betekent $1178/62 = 19$ werkdagen in mei.

1.4 Balansmethode

Inleiding

Henk's moeder leest haar elektrische auto voor € 360 per maand. Omdat ze in haar nieuwe functie veel voor haar werkgever met de auto op pad is, legt ze maandelijks flink wat kilometers af. Elke km kost haar gemiddeld € 0,07. Ze krijgt van haar werkgever een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km.

Henk gaat uitrekenen vanaf hoeveel km daarmee al haar autokosten gedekt zijn.

Hij gebruikt daarbij het balansmodel: op beide schaaltes moet evenveel liggen om evenwicht te hebben.

Hoe werkt dat balansmodel?



Figuur 4.1

Je leert in dit onderwerp

- een vergelijking zien als een balans waarvan aan beide zijden van het isgelijkteken de uitkomst gelijk moet blijven;
- een vergelijking oplossen met de balansmethode.

Voorkennis

- rekenen, ook met negatieve getallen;
- de begrippen formule, grootte, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;
- uitdrukkingen herleiden door vermenigvuldigen van factoren en optellen/afrekken van gelijksoortige termen;
- bij een formule een rekenschema en een terugrekenschema opstellen en gebruiken om een variabele te berekenen.



Aantekeningen

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares. The grid is intended for drawing graphs or writing notes related to the subject matter.



Theorie

Om te onthouden

A large grid of graph paper with 20 columns and 30 rows, intended for taking notes on the theory of the balancing method.



Verwerken

Opgave 4.1

Los de volgende vergelijkingen op. Gebruik waar nodig de balansmethode, maar terugrekenen mag natuurlijk ook.

- a $12 \cdot g + 3 = 7 \cdot g + 18$
- b $10 + 6 \cdot g = 2 + 8 \cdot g$
- c $12 - 4g = 36 + 2g$
- d $5 \cdot g = g + 8$
- e $5200 + 15 \cdot g = 600$
- f $-6 \cdot g + 55 = 4 \cdot g - 25$
- g $3 - g = 6 + 2g$
- h $\frac{1}{2}g + \frac{7}{2} = 2g - 5\frac{1}{2}$
- i $320 + 0,5g = 950 - 1,25g$
- j $17 = 4 - 11g$

Opgave 4.2

Op school staat een kopieermachine. Leerlingen mogen daar voor 10 cent per kopie gebruik van maken.

De school huurt deze machine voor € 150,00 per maand en elke kopie kost de school 7,5 cent.

De vraag is: "Vanaf welk aantal kopieën per maand zijn de kosten voor het gebruiken van deze kopieermachine even groot als de inkomsten?"

Bij deze vraag past de vergelijking $150 + 0,075 \cdot a = 0,10 \cdot a$.

Hierin is a het aantal kopieën per maand.

- a Leg uit dat die vergelijking bij de vraag past.
- b Los deze vergelijking op met de balansmethode.
- c Wat is nu het antwoord op de gestelde vraag?

Opgave 4.3

Bij het opbranden van een kaars hoort de formule $L = 20 - 1,5 \cdot t$, waarin L de lengte in cm en t de brandtijd in uren is.

- a Welke vergelijking hoort er bij de vraag: "Na hoeveel uur is deze kaars nog 5 cm lang?"
- b Waarom kun je deze vergelijking zowel met de balansmethode als door terugrekenen oplossen?
- c Wat is nu het antwoord op de gestelde vraag?

Opgave 4.4

Bij het opbranden van een kaars hoort de formule $L = 20 - 1,5 \cdot t$, waarin L de lengte in cm en t de brandtijd in uren is.

Voor een tweede kaars geldt dat hij bij aansteken 30 cm lang is en elk uur 3,25 cm korter wordt als hij opbrandt. Beide kaarsen worden tegelijkertijd aangestoken.

- a Welke vergelijking hoort er bij de vraag: "Na hoeveel uur zijn beide kaarsen even lang?"
- b Waarom kun je deze vergelijking alleen met de balansmethode oplossen?

- c Wat is nu het antwoord op de gestelde vraag? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

Toepassen

Henk's moeder leest haar elektrische auto voor € 360 per maand. Omdat ze in haar nieuwe functie veel voor haar werkgever met de auto op pad is, legt ze maandelijks flink wat kilometers af. Elke km kost haar gemiddeld € 0,07. Ze krijgt van haar werkgever een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km.

Henk gaat uitrekenen vanaf hoeveel km daarmee al haar autokosten gedekt zijn.

Economen noemen dit het **break-even-point**. Dat is het punt waarin de opbrengst gelijk is aan de totale kosten.



Figuur 4.2

Opgave 4.5: Reiskostenvergoeding

Bij **Toepassen** zie je welke kosten en welke vergoeding Henk's moeder heeft. Noem haar werkkilometers a .

- Stel een vergelijking op die Henk gaat oplossen.
- Los deze vergelijking op.
- Bij hoeveel werkkilometers per maand raakt Henk's moeder uit de kosten?
- Zijn daarmee ook echt alle autokosten per maand gedekt?

Opgave 4.6: Break-even-point

Voor het aantal liters ActivExtra x dat per maand wordt verkocht geldt: $R = 1,15 \cdot x$.

Ook het aantal maandelijks geproduceerde liters is x liter en er geldt: $K = 25000 + 0,80 \cdot x$.

Maak je een grafiek van R en een grafiek van K in één figuur, dan is het break-even-point het snijpunt van beide.

- Met welke vergelijking kun je dat snijpunt berekenen?
- Los deze vergelijking op met de balansmethode.
- Vanaf welk aantal liter gaat de firma die ActivExtra produceert hieraan winst maken?

Practicum

Met **AlgebraKIT** kun je oefenen met **vergelijkingen oplossen met de balansmethode**.

Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.

Met 'Toon uitwerking' zie je het verder uitklapbare antwoord.

Met  krijg je een nieuwe opgave.

Werk met AlgebraKIT.

Antwoorden

4.1 a Dat gaat zo:

$$\begin{aligned} 12 \cdot g + 3 &= 7 \cdot g + 18 && \text{beide zijden } -3 \\ 12 \cdot g &= 7 \cdot g + 15 && \text{beide zijden } -7 \cdot g \\ 5 \cdot g &= 15 && \text{beide zijden } /5 \\ g &= 15/5 = 3 \end{aligned}$$

b Dat gaat zo:

$$\begin{aligned} 10 + 6 \cdot g &= 2 + 8 \cdot g && \text{beide zijden } -10 \\ 6 \cdot g &= -8 + 8 \cdot g && \text{beide zijden } -8 \cdot g \\ -2 \cdot g &= -8 && \text{beide zijden } /5 \\ g &= -8/-2 = 4 \end{aligned}$$

c Dat gaat zo:

$$\begin{aligned} 12 - 4g &= 36 + 2g && \text{beide zijden } +4g \\ 12 &= 36 + 6g && \text{beide zijden } -36 \\ -24 &= 6g && \text{beide zijden } /6 \\ g &= -24/6 = -4 \end{aligned}$$

d Dat gaat zo:

$$\begin{aligned} 5 \cdot g &= 8 + g && \text{beide zijden } -g \\ 4 \cdot g &= 8 && \text{beide zijden } /4 \\ g &= 8/4 = 2 \end{aligned}$$

e Omdat de onbekende g maar aan één kant van het isgelijktteken voorkomt, kun je deze vergelijking oplossen met terugrekenen. Je ziet dan in één keer: $g = (600 - 5200) / 15 = -\frac{920}{3}$. (Maak eventueel een rekenschema en een terugrekenenschema.)

f Dat gaat zo:

$$\begin{aligned} -6 \cdot g + 55 &= 4 \cdot g - 25 && \text{beide zijden } -55 \\ -6g &= 4 \cdot g - 80 && \text{beide zijden } -4 \cdot g \\ -10 \cdot g &= -80 && \text{beide zijden } /5 \\ g &= -80/-10 = 8 \end{aligned}$$

g Dat gaat zo:

$$\begin{aligned} 3 - g &= 6 + 2g && \text{beide zijden } +g \\ 3 &= 6 + 3g && \text{beide zijden } -6 \\ -3 &= 3g && \text{beide zijden } /3 \\ g &= -3/3 = -1 \end{aligned}$$

h Dat gaat zo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}g + \frac{7}{2} &= 2g - 5\frac{1}{2} && \text{beide zijden } \times 2 \\ -g + 7 &= 4g - 11 && \text{beide zijden } -7 \\ -g &= 4g - 18 && \text{beide zijden } -4g \\ -5g &= -18 && \text{beide zijden } /5 \\ g &= -18/-5 = 3,6 \end{aligned}$$



i Dat gaat zo:

$$\begin{aligned} 320 + 0,5g &= 950 - 1,25g && \text{beide zijden } -320 \\ 0,5g &= 630 - 1,25g && \text{beide zijden } +1,25g \\ 1,75g &= 630 && \text{beide zijden } /5 \\ g &= 630/1,75 = 360 \end{aligned}$$

j Dat gaat zo:

$$\begin{aligned} 17 &= 4 - 11g && \text{beide zijden } -4 \\ 13 &= -11g && \text{beide zijden } /-11 \\ g &= 13/-11 = -\frac{13}{11} \end{aligned}$$

4.2 a De school betaalt 150 euro plus a maal 0,075. De inkomsten zijn a maal 0,10.

b Je vindt: $a = 6000$.

c Bij 6000 kopieën zijn inkomsten en uitgaven voor de school gelijk.

4.3 a $20 - 1,5 \cdot t = 5$

b De onbekende t komt maar aan één kant van het isgelijktteken voor.

c Als je de vergelijking oplost, vind je $t = 10$, dus na 10 uur is de kaars nog 5 cm lang.

4.4 a $20 - 1,5t = 30 - 3,25t$

b De onbekende t komt aan beide zijden van het isgelijktteken voor.

c Als je de vergelijking oplost, vind je $t = 10/1,75 \approx 5,71$, dus na ongeveer 5,7 uur zijn beide kaarsen even lang.

4.5 a $0,07 \cdot a + 360 = 0,19 \cdot a$

b Dat gaat zo:

$$\begin{aligned} 0,07 \cdot a + 360 &= 0,19 \cdot a \\ 360 &= 0,12 \cdot a \\ 0,12 \cdot a &= 360 \\ a &= 360/0,12 = 3000 \end{aligned}$$

c Vanaf 3000 werkkilometers per maand.

d Nee, de kilometers die ze privé nog rijdt, tellen hierbij niet mee.

4.6 a $1,15 \cdot x = 25000 + 0,80 \cdot x$

b Je krijgt $x = 25000/0,35 \approx 71429$ liter ActivExtra (afgerond op gehelen).

c Vanaf een verkoop van ongeveer 71500 liter ActivExtra per maand. (Gezien de gegevens over de vaste kosten hoeft dit getal niet veel nauwkeuriger te worden gegeven.)

1.5 Ongelijkheden

Inleiding

Elektrisch rijden levert minder vervuiling op dan een verbrandingsmotor. Maar wat is goedkoper, elektrisch rijden of nog ouderwets rijden op benzine?

Henk gaat dat eens voor zijn moeder uitzoeken.

Hij vergelijkt de auto van zijn moeder met de benzineversie ervan.

Vanaf hoeveel kilometer per maand is de elektrische versie goedkoper?

Auto leasen		
Kosten in €	elektrisch	benzine
per maand	360	220
per km	0,07	0,12

Figuur 5.1

Je leert in dit onderwerp

- vergelijkingen en ongelijkheden bij lineaire verbanden opstellen en oplossen.

Voorkennis

- de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;
- recht evenredige en lineaire verbanden herkennen en het hellingsgetal bepalen;
- formules en grafieken bij recht evenredige en lineaire verbanden maken en gebruiken;
- grafieken bij formules maken en vergelijkingen oplossen met behulp van de balansmethode.



Aantekeningen

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.



Theorie

Om te onthouden


A large grid of graph paper with a light green background and a light gray grid pattern, intended for taking notes.

Verwerken

Opgave 5.1

Je ziet de grafieken van twee lineaire verbanden $y = 3 + 0,40 \cdot x$ en $y = 1,25 \cdot x$.

- Los op in twee decimalen nauwkeurig: $3 + 0,40 \cdot x = 1,25 \cdot x$.
- Los op: $3 + 0,40 \cdot x < 1,25 \cdot x$.
- Controleer je antwoord bij b voor enkele waarden van x .



Figuur 5.2

Opgave 5.2

Voor de jaarlijkse kosten K (euro) voor het waterverbruik v (m^3) in twee gebieden A en B gelden de formules:

- gebied A: $K = 36 + 1,80v$
- gebied B: $K = 48 + 1,55v$

Schrijf bij de volgende vragen steeds de bijbehorende ongelijkheid op en los deze vergelijking op. Geef je antwoord in m^3 nauwkeurig.

- Bij welk verbruik zijn de kosten in gebied A lager dan in gebied B?
- Bij welk verbruik zijn de kosten in gebied B hoger dan € 200?

Opgave 5.3

De temperatuur boven het aardoppervlak hangt onder andere af van de hoogte waarop je je bevindt. Vooral voor bergbeklimmers is het belangrijk om te weten dat elke stijging van 1 km een daling van de temperatuur van ongeveer 6°C betekent.


Twee bergbeklimmers meten een temperatuur van 16°C .

- Welke temperatuur meten zij als ze nog 120 m omhoog klimmen?
- Het aantal meters dat ze omhoog gaan, kun je h noemen. Welke formule geeft dan het verband weer tussen temperatuur T in $^\circ\text{C}$ en h ?
- Welke ongelijkheid hoort er bij de vraag: "Na hoeveel meter stijgen komt de temperatuur die ze meten, onder het vriespunt?"
- Los de ongelijkheid bij c op. Geef je antwoord in tientallen meters nauwkeurig.

Opgave 5.4

Je ziet de grafieken van twee cilindervormige kaarsen die tegelijk worden aangestoken.

- Stel bij elk van deze grafieken een formule op.
- Na hoeveel minuten is kaars I langer dan kaars II?



Figuur 5.3

Toepassen

Op de [website van de ANWB](#) stond begin 2022 nog een vergelijking van twee versies van de Renault Clio:

- de benzineversie kostte € 457 per maand
verbruik 1 liter benzine per 15 km, met benzineprijs € 1,51 per liter
- de dieselversie kostte € 580 per maand
verbruik 1 liter diesel per 20 km, met dieselprijs € 1,24 per liter



Figuur 5.4

Henk rekent dit voorbeeld even door. Later gaat hij zoeken naar meer actuele prijzen. Welke auto is voordeliger?

Opgave 5.5: Rekenvoorbeeld ANWB

Gebruik de gegevens uit [Toepassen](#) hierboven.

- Hoeveel kost het rijden met de benzineversie per km? En hoeveel is dit voor de dieselversie?
- De kosten K per maand (in euro) hangen af van het aantal gereden km. Geef voor beide versies een formule voor K .
- Voor welke waarden van a is de dieselversie goedkoper dan de benzineversie?

Opgave 5.6: De auto van Henk's moeder

Henk vergelijkt de auto van zijn moeder met de benzineversie ervan en gebruikt de gegevens in de figuur. Hij neemt voor het aantal km dat ze maandelijks rijdt de variabele a .

	Auto leasen	
Kosten in €	elektrisch	benzine
per maand	360	220
per km	0,07	0,12

Figuur 5.5

Bereken nu met behulp van een ongelijkheid vanaf hoeveel km/maand de elektrische versie goedkoper is.

Antwoorden

5.1 a Dat gaat zo:

$$3 + 0,40x = 1,25x$$

$$0,40x = 1,25x - 3$$

$$-0,85x = -3$$

$$x = -3 / -0,85 \approx 3,53$$

b Bekijk de grafieken. De grafiek van y_1 ligt onder de grafiek van y_2 aan de rechterkant van het snijpunt. Dus geldt: $x > 3,53$.

c Kies zelf een paar waarden voor x die groter zijn dan 3,53 en vul ze in de ongelijkheid in. Bijvoorbeeld voor $x = 4$ wordt de ongelijkheid $3 + 0,4 \cdot 4 < 1,25 \cdot 4$ en $4,6 < 5$. Dit klopt.

5.2 a De ongelijkheid is: $36 + 1,80v < 48 + 1,55v$.

De bijbehorende vergelijking $36 + 1,80v = 48 + 1,55v$ heeft als oplossing $v = 48 \text{ m}^3$ (gebruik de balansmethode).

Dus zijn de kosten in A kleiner dan in B als: $v < 48 \text{ m}^3$.

b De ongelijkheid is: $48 + 1,55v > 200$.

De bijbehorende vergelijking $48 + 1,55v = 200$ heeft als oplossing (afgerond) $v \approx 98 \text{ m}^3$.

Dus zijn de kosten in B groter dan € 200 als $v > 98 \text{ m}^3$.

5.3 a Per 1000 m klimmen daalt de temperatuur met 6 graden.

Dus per m daalt de temperatuur met 0,006 graden.

Bij 120 m klimmen daalt de temperatuur met $120 \cdot 0,006 = 0,72$ graden.

Omdat de temperatuur 16 graden is, meten ze ongeveer 15,3 °C.

b $T = 16 - 0,006h$.

c $16 - 0,006h < 0$

d $16 - 0,006h = 0$ geeft $h = 2666\frac{2}{3}$, dus het antwoord op c is: $h > 2670 \text{ m}$.

5.4 a • Kaars I: startgetal 20 cm en na 10 uur is er 10 cm opgebrand.

Er brandt dus 1 cm/uur op. Formule: $L = 20 - t$.

• Kaars II: startgetal 30 cm en na 12 uur is er 30 cm opgebrand.

Er brandt dus $30/12 = 2,5$ cm/uur op. Formule: $L = 30 - 2,5t$.

b Beide kaarsen zijn even lang als: $20 - t = 30 - 2,5t$. Oplossen geeft:

$$20 - t = 30 - 2,5t$$

$$-t = 10 - 2,5t$$

$$1,5t = 10$$

$$x = \frac{10}{1,5}$$

$$x = 6\frac{2}{3}$$

Kaars I is langer dan kaars II als beide kaarsen meer dan 400 minuten hebben gebrand.

5.5 a Benzineversie: $1,51/15 \approx 0,10$ euro/km.

Dieserversie: $1,24/20 \approx 0,06$ euro/km.

b Benzineversie: $K = 457 + 0,10 \cdot a$ euro.

Dieserversie: $K = 580 + 0,06 \cdot a$ euro.

c Ongelijkheid: $580 + 0,06 \cdot a < 457 + 0,10 \cdot a$.



Los met behulp van de balansmethode de vergelijking $580 + 0,06 \cdot a = 457 + 0,10 \cdot a$ op.
Als je dit goed doet vind je $a = 3075$.

De dieserversie is goedkoper als je meer dan 3075 km aflegt per maand.

5.6 Voor de maandkosten K van de elektrische versie geldt: $K = 360 + 0,07 \cdot a$.

Voor de maandkosten K van de benzineversie geldt: $K = 220 + 0,12 \cdot a$.

Ongelijkheid: $360 + 0,07a < 220 + 0,12a$.

Los de bijbehorende vergelijking op met de balansmethode en schets beide grafieken.

Je vindt: $a > 2800$.

De elektrische versie is goedkoper bij meer dan 2800 km per maand.

1.6 Totaalbeeld

Samenvatten

Begrippenlijst

- recht evenredig (verband) — evenredigheidsconstante, hellingsgetal
- lineair verband — hellingsgetal, startgetal
- rekenschema — terugrekenen
- lineaire vergelijking — balansmethode
- lineaire ongelijkheid

Activiteitenlijst

- formules en grafieken bij recht evenredige verbanden maken en gebruiken
- formules en grafieken bij lineaire verbanden maken en gebruiken
- vergelijkingen bij lineaire verbanden oplossen door terugrekenen
- vergelijkingen bij lineaire verbanden oplossen met de balansmethode
- lineaire ongelijkheden oplossen

Opgave 6.1

Hiernaast zie je twee rechte lijnen in een assenstelsel.


Grafiek I stelt de opbrengst R (euro) afhankelijk van de hoeveelheid x (kg) voor.

Grafiek II stelt de kosten K (euro) afhankelijk van de hoeveelheid x (kg) voor.

- a Bij welk van beide grafieken is sprake van een recht evenredig verband? En waarom?

Werk nu verder met de grafiek bedoeld in a.

- b Bij deze grafiek hoort een evenredigheidsconstante. Hoe groot is die evenredigheidsconstante?
- c Schrijf de formule op die bij deze grafiek hoort.



Figuur 6.1

Opgave 6.2

In de vorige opgave zie je twee rechte lijnen in een assenstelsel.

Bij beide grafieken is sprake van een lineair verband.

- a Waarom?
- b Bepaal het hellingsgetal van grafiek II. Stel een formule op bij deze grafiek.
- c Ga met behulp van een berekening na of het punt $(11,105)$ op grafiek II ligt.

Opgave 6.3

Gebruik de formules $R = 15 \cdot x$ en $K = 50 + 5 \cdot x$.

Hierin is R de opbrengst en K de kosten in euro bij x kg.

- a Met welke vergelijking kun je berekenen wanneer de kosten 130 euro bedragen?
- b Los de in a bedoelde vergelijking op met behulp van terugrekenen.



- c Los de in a bedoelde vergelijking op met behulp van de balansmethode.

Opgave 6.4

Gebruik de formules $R = 15 \cdot x$ en $K = 50 + 5 \cdot x$.

Hierin is R de opbrengst en K de kosten in euro bij x kg.

- a Met welke vergelijking kun je de x -waarde van het snijpunt van beide grafieken berekenen?
b Los de in a bedoelde vergelijking op.
c Bereken de coördinaten van het snijpunt van beide grafieken.
d Oefen het oplossen van lineaire vergelijkingen in het **Practicum**.

Opgave 6.5

Gebruik de formules $R = 15 \cdot x$ en $K = 50 + 5 \cdot x$.

Hierin is R de opbrengst en K de kosten in euro bij x kg.

Je wilt alle waarden van x bepalen waarvoor de opbrengst hoger is dan de kosten.

Daarbij hoort de ongelijkheid $15 \cdot x > 50 + 5 \cdot x$.

- a Waarom moet je daarvoor eerst de vergelijking $15 \cdot x = 50 + 5 \cdot x$ oplossen?
b Los de ongelijkheid op.

Testen

Opgave 6.6

Maandag regent het vanaf 8:00 uur voortdurend. Het water in een cilindervormige regenmeter stijgt elke 10 minuten gelijkmatig met 6 mm. Om 8:00 uur was de regenmeter leeg. De waterhoogte wordt aangegeven door h in millimeters en de tijd door t in minuten met $t = 0$ om 8:00 uur.

- a Waarom is h recht evenredig met t ?
b Welke formule geeft het verband tussen h en t ?
c Teken een grafiek van h afhankelijk van t .
d Welk hellingsgetal heeft deze grafiek?
e Na hoeveel minuten regenen is de waterhoogte 20 mm?

★ Opgave 6.7

Een cilindervormige regenmeter wordt 's avonds geleegd. Het regent 's nachts een beetje. Om 8:00 uur de volgende dag staat er 21 mm water in de meter. Dan regent het zo hard dat er elke 10 minuten 5,5 mm water bijkomt.

De waterhoogte wordt aangegeven door h in millimeters en de tijd door t in minuten.

- a Welke formule geeft het verband tussen h en t ?
b Teken een grafiek van h afhankelijk van t .
c Waarom is h nu niet recht evenredig met t ?
d Welk hellingsgetal heeft deze grafiek?
e Als het minder hard regent, wordt het hellingsgetal dan groter of kleiner?
f Hoelang na 8:00 uur blijft de waterhoogte in de regenmeter onder de 50 mm? Geef je antwoord in minuten nauwkeurig.

★ **Opgave 6.8**

Los de vergelijkingen op.

- a $5 \cdot x + 30 = 32 + x$
- b $320 + 2,5 \cdot a = 4,25 \cdot a$
- c $36 - 0,14 \cdot x = 22 + 0,5 \cdot x$
- d $\frac{1}{3} \cdot x - 2 = \frac{5}{6} \cdot x - 3\frac{1}{3}$

★ **Opgave 6.9**

Een school huurt voor € 2500,00 per jaar een kopieermachine voor de leerlingen. De school heeft uitgerekend dat elke kopie aan papier en inkt € 0,05 kost. Die € 0,05 komt extra bij het bedrag dat de leerlingen per kopie moeten betalen. De variabele a is het aantal kopieën dat leerling per jaar met deze machine maken.

- a Stel een formule op voor de kosten K in euro per jaar die de school maakt afhankelijk van a .
- b Van welk soort verband is er nu sprake? Teken een bijpassende grafiek voor 0 tot en met 50000 kopieën.
- c Hoeveel kopieën per jaar moeten er worden gemaakt om met een prijs voor de leerlingen van € 0,20 per kopie uit de kosten te komen?

★ **Opgave 6.10**

Los de ongelijkheid $7 - 2x < 0,5x + 1$ op.

Toepassen

Opgave 6.11: Een auto leasen

Je kunt een auto ‘leasen’. Dat betekent: je krijgt de auto in gebruik, maar hij is eigendom van een leasebedrijf. Je betaalt dan een vast bedrag per maand waar alles bij in zit (aanschaf, onderhoud, etc.). Verder zijn er natuurlijk kosten per gereden km, de energiekosten. Dat geldt als je elektrisch rijdt, maar ook voor rijden op brandstoffen.


- a Verzamel actuele informatie over het leasen van een auto. Kies zelf een merk en een type waar zowel een zuiver elektrische versie als een brandstofversie van bestaat.
- b Stel formules op voor de maandelijkse kosten voor beide versies afhankelijk van het aantal gereden km.
- c Laat door berekening zien, welke van beide versies bij welk aantal gereden km voordeliger is.



Figuur 6.2

Opgave 6.12: Grootverbruikers gastarief

Als je meer dan 600 m^3 gas per jaar verstoekt, ben je een grootverbruiker. Dat geldt bijvoorbeeld voor de glastuinbouw. Om zijn kassen warm te houden verstoekt een tuinder nogal wat gas. Om dit betaalbaar te houden heeft het gasbedrijf een grootverbruikstarief. In de grafiek zie je wat gegevens (in €). De knik in de grafiek zit bij het punt (600,130).



Figuur 6.3

- a** Waarom vertoont de grafiek een knik?
- b** Hoeveel bedragen de vaste kosten per jaar en de prijs per m^3 voor een kleinverbruiker? Schrijf je berekening op.
 a is het aantal verbruikte m^3 gas en K zijn de jaarlijkse kosten (in €) bij grootverbruik. Er geldt dan $K = 70 + 0,10a$.
- c** Ga na, dat deze formule overeen komt met de grafiek voor de grootverbruiker.
- d** Bij welk grootverbruik komen de jaarlijkse kosten boven de € 200?

Antwoorden

6.1 a Bij grafiek I, want deze grafiek is een rechte lijn door de oorsprong van het assenstelsel.

b $\frac{30}{2} = 15$ euro/kg.

c $R = 15 \cdot x$

6.2 a Beide grafieken zijn rechte lijnen.

b Het hellingsgetal is $\frac{10}{2} = 5$ en een bijpassende formule is $K = 50 + 5 \cdot x$.

c $50 + 5 \cdot 11 = 105$, dus dit punt ligt inderdaad op grafiek II.

6.3 a $50 + 5 \cdot x = 130$

b Rekenschema: $x \rightarrow [\cdot 5] \rightarrow \dots \rightarrow [+50] \rightarrow 130$.

Terugrekenchema: $x \leftarrow [/5] \leftarrow \dots \leftarrow [-50] \leftarrow 130$.

Je vindt: $x = (130 - 50)/5 = 16$ kg.

c Dat gaat zo:

$$\begin{array}{l} 50 + 5 \cdot x = 130 \\ 5 \cdot x = 80 \\ x = \frac{80}{5} = 16 \end{array}$$

beide zijden -50
beide zijden delen door 5

6.4 a $15 \cdot x = 50 + 5 \cdot x$

b Dat gaat zo:

$$\begin{array}{l} 15 \cdot x = 50 + 5 \cdot x \\ 10 \cdot x = 50 \\ x = \frac{50}{10} = 5 \end{array}$$

beide zijden $-5 \cdot x$
beide zijden delen door 10

c (5,75).

d Je oefent jezelf met AlgebraKIT.

6.5 a Je weet dan voor welke x opbrengst en kosten gelijk zijn.

b Daarna kun je aan de grafieken (bij de eerste opgave) zien aan welke kant van dit snijpunt $R > K$.

De x -waarde van het snijpunt is: $x = 5$.

Aan de grafieken zie je nu dat de oplossing van de ongelijkheid $x > 5$ is.

6.6 a Tweemaal zo lang regenen geeft een tweemaal zo grote waterhoogte, omdat de waterhoogte gelijkmatig stijgt (elke minuut evenveel).

b $h = 0,6 \cdot t$

c De grafiek wordt een rechte lijn door $O(0,0)$ en $(10,6)$.

d 0,6

e Dat gaat zo:

$$0,6t = 20$$

$$t = \frac{20}{0,6} = 33\frac{1}{3}$$

Na $33\frac{1}{3}$ minuten.

6.7 a $h = 21 + 0,55 \cdot t$

b De grafiek wordt een rechte lijn door $(0,21)$ en $(10; 26,5)$.



- c** De grafiek van h gaat niet door de oorsprong van het assenstelsel.
d 0,55
e Het hellingsgetal wordt kleiner.
f Los de vergelijking $21 + 0,55 \cdot t = 50$ op door terugrekenen of met de balansmethode.

$$21 + 0,55 \cdot t = 50$$

$$0,55 \cdot t = 29$$

$$t = \frac{29}{0,55} \approx 52,7$$

Dus bijna 53 minuten.

- 6.8 a** Dat gaat zo:

$$5x + 30 = 32 + x$$

$$5x = 2 + x$$

$$4x = 2$$

$$x = 2/4 = 0,5$$

- b** Dat gaat zo:

$$320 + 2,5a = 4,25a$$

$$320 = 1,75a$$

$$1,75a = 320$$

$$a = 320/1,75 \approx 182,86$$

- c** Dat gaat zo:

$$36 - 0,14x = 22 + 0,5x$$

$$-0,14x = -14 + 0,5x$$

$$-0,64x = -14$$

$$x = -14/-0,64 = 21,875$$

- d** Dat gaat zo:

$$\frac{1}{3} \cdot x - 2 = \frac{5}{6} \cdot x - 3\frac{1}{3}$$

$$2 \cdot x - 12 = 5 \cdot x - 20$$

$$2x = 5x - 8$$

$$-3x = -8$$

$$x = -8/-3 = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$$

- 6.9 a** $K = 2500 + 0,05 \cdot a$

- b** Het is een lineair verband met een grafiek door (0,2500) en (1000,2550).

- c** Hierbij hoort de ongelijkheid $2500 + 0,05 \cdot a < 0,20 \cdot a$.

$$2500 + 0,05a = 0,20a$$

$$2500 = 0,15a$$


$$0,15a = 2500$$

$$a = 2500/0,15 = 16666\frac{2}{3}$$

Dus bij 16667 kopieën of meer is de school uit de kosten.



6.10 Teken de grafieken van $y = 7 - 2x$ en $y = 0,5x + 1$ in één figuur.



Los de bijbehorende vergelijking op:

$$7 - 2x = 0,5x + 1$$

$$-2x = 0,5x - 6$$

$$-2,5x = -6$$

$$x = -6 / -2,5 = 2,4$$

De oplossing van de ongelijkheid lees je uit de grafiek af: $x > 2,4$.

6.11 a Eigen antwoord.

b Eigen antwoord.

c Eigen antwoord. Stel in ieder geval een ongelijkheid op en los die op.

6.12 a Vanaf 600 m^3 betaal je minder per kubieke meter gas.

b Vaste kosten per jaar: € 40.

Prijs per m^3 : $\frac{130-40}{600} = 0,15$, dus € 0,15.

c De kosten voor de eerste 600 m^3 zijn: $70 + 0,10 \cdot 600 = 130$ euro.

Prijs per m^3 boven de 600 m^3 zijn € 0,10 per m^3 en dat klopt met de grafiek. Bereken eventueel nog wat extra punten.

d Los op: $70 + 0,10a > 200$.

Als $a > 1300 \text{ m}^3$ per jaar.



Leerdoelentabel

In het achter de opgave kun je aangeven hoe je de opgave hebt gemaakt:

✓ goed gemaakt — **S** wel begrepen maar een slordige fout gemaakt — **H** hulp nodig gehad — **G** samen met groepje goed gemaakt — **X** fout gemaakt en niet goed begrepen — **N** niet bekeken

1	Recht evenredig	★	★★	★★★
	Formules en grafieken bij recht evenredige verbanden maken en gebruiken.	1.2 <input type="checkbox"/> 1.3 <input type="checkbox"/> 1.4 <input type="checkbox"/>		
	Betekenis van evenredigheidsconstante en hellingsgetal begrijpen.			
	Van een formule en/of grafiek bepalen of er sprake is van een recht evenredig verband.	1.2 <input type="checkbox"/> 1.3 <input type="checkbox"/> 1.4 <input type="checkbox"/>		
2	Lineaire verbanden	★	★★	★★★
	Formules en grafieken bij lineaire verbanden maken en gebruiken; rekenschema's bij lineaire verbanden maken en gebruiken.	2.1 <input type="checkbox"/> 2.2 <input type="checkbox"/> 2.3 <input type="checkbox"/>	2.4 <input type="checkbox"/> 3.4 <input type="checkbox"/>	
	Voorspellen hoe een grafiek verandert wanneer het bijbehorende lineaire verband verandert.			
3	Terugrekenen	★	★★	★★★
	Het begrip lineaire vergelijking, en vergelijkingen grafisch oplossen; rekenschema's bij lineaire verbanden maken en deze gebruiken om vergelijkingen op te lossen door terugrekenen.	3.1 <input type="checkbox"/> 3.2 <input type="checkbox"/> 3.3 <input type="checkbox"/>		
4	Balansmethode	★	★★	★★★
	Lineaire vergelijkingen oplossen met de balansmethode.			
5	Ongelijkheden	★	★★	★★★
	Vergelijkingen en ongelijkheden bij lineaire verbanden opstellen en oplossen.	T6.10 <input type="checkbox"/>		

Het lesmateriaal in deze reader is gebaseerd op het materiaal dat ook op de Math4All website staat.

De reader is gegenereerd met de Math4All maatwerkdienst. De inhoud en de volgorde van de onderwerpen in deze reader zijn gekozen door docenten van het ConTeXt College.

Stichting Math4All



www.math4all.nl

