

5.2 Normaalkromme

Inleiding

Bij heel veel continue toevalsvariabelen blijkt een mooie symmetrische klokvormige kansdichtheidsfunctie te horen. Dat geldt voor het gewicht van appels, de lengte van een grote groep mensen, vulgewichten van literpakken, e.d.

De beroemde wiskundige Gauss (1777 - 1855) vond er een formule voor. Sinds die tijd spreek je van een 'Gausskromme' of ook wel 'normaalkromme'. Bijvoorbeeld is het vulgewicht van pakken suiker ongeveer normaal verdeeld.



Figuur 1

Je leert in dit onderwerp

- kansen berekenen bij normaal verdeelde stochasten.


Voorkennis

- werken met continue stochasten;
- de normaalkromme als voorbeeld van kansdichtheidsfunctie hanteren;
- de vuistregels voor de normaalkromme gebruiken.

Verkennen

Opgave V1

Hier zie je de lengteverdeling van een groep soldaten op een bepaalde kazerne.




Figuur 2

Bij de lengte L hoort een normaalkromme met gemiddelde $\mu(L) = 182$ en standaardafwijking $\sigma(L) = 7$ cm.

- Laat zien dat hierbij de kansdichtheidsfunctie $f(x) = \frac{1}{7 \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-182}{7} \right)^2}$ past.
- Laat zien dat $P(182 - 7 \leq X \leq 182 + 7) \approx 0,68$.
- Laat zien dat $P(182 - 14 \leq X \leq 182 + 14) \approx 0,95$.

Uitleg



Figuur 3

Bekijk de lengteverdeling van een groep soldaten op een bepaalde kazerne hierboven nog eens. De lengte L is een continue stochast. De kromme is een benadering van de grafiek van de bijpassende kansdichtheidsfunctie. De benadering wordt beter als je meer klassen maakt. De grafiek heeft een mooie klokvorm die wordt bepaald door gemiddelde $\mu(L) = 182$ cm en standaardafwijking $\sigma(L) = 7$ cm.

Hierbij past de kansdichtheidsfunctie $f(x) = \frac{1}{7 \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-182}{7}\right)^2}$.

Een kansdichtheidsfunctie van deze vorm heet een normale kansdichtheidsfunctie, de grafiek ervan is een normaalkromme. Je zegt dat L normaal verdeeld is. De bijbehorende kansen kun je berekenen door integreren, maar ook meteen met de GR. Enkele vuistregels ken je al uit [Statistiek, Uitspraken doen](#).

Bekijk het [Practicum](#).

Opgave 1

Bestudeer de [Uitleg](#).

Bekijk het histogram van de lengteverdeling van de soldaten.

- Hoeveel bedraagt $P(165 \leq L < 180)$ volgens het histogram? Geef je antwoord als getal tussen 0 en 1.
- Bepaal $P(165 \leq L < 180)$ met behulp van een integraal.
Deze kans kun je ook bepalen door uit te gaan van de normaalkromme als model voor de lengteverdeling van de soldaten. Je grafische rekenmachine kent de normale verdeling. Je schrijft de gevraagde kans vaak als $P(165 \leq L < 180 | \mu(L) = 182 \wedge \sigma(L) = 7)$. De vier getallen in deze uitdrukking moet je in de grafische rekenmachine in de juiste volgorde in de normaalverdeling invoeren. Bekijk het [Practicum](#).
- Bepaal $P(165 \leq L < 180 | \mu(L) = 182 \wedge \sigma(L) = 7)$.
- Bereken de kans dat een soldaat tussen 166 en 177 cm lang is.
- Bereken hoeveel procent van de soldaten kleiner dan 166 cm is.
- Bereken hoeveel procent van de soldaten langer dan 192 cm is.

Opgave 2

Kijk weer naar de lengteverdeling van de soldaten en de bijpassende kansdichtheidsfunctie.

- Laat met behulp van differentiëren zien, dat de top van de normaalkromme bij $\mu = 182$ zit en dat de x -waarden van de buigpunten $\mu - \sigma$ en $\mu + \sigma$ zijn.
- Laat zien dat ongeveer 68% van de soldaten een lengte heeft tussen $\mu - \sigma$ en $\mu + \sigma$.

- c Hoeveel procent van de soldaten heeft volgens de normaalcurve een lengte die minder dan twee standaarddeviaties van het gemiddelde afwijkt?
- d Hoeveel procent van de soldaten heeft volgens de normaalcurve een lengte die minder dan drie standaarddeviaties van het gemiddelde afwijkt?

Theorie en voorbeelden

Om te onthouden


Bekijk de applet: Normale verdeling

Bij continue stochasten zoals lengte, gewicht, inhoud, etc., hebben de relatieve frequentiehistogrammen vaak de kenmerkende klokvorm. Dergelijke klokvormige histogrammen kun je benaderen door de kansdichtheidsfunctie

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Hierin is μ het gemiddelde en σ de standaardafwijking van de frequentieverdeling.

De grafiek van deze functie noem je de **normaalcurve** of Gausscurve. De twee buigpunten van deze curve zitten bij $x = \mu + \sigma$ en $x = \mu - \sigma$.




Figuur 4

De bijbehorende **normale kansen** zijn te vinden door de oppervlakte te berekenen van het juiste gebied onder de normaalcurve. De bijbehorende stochast X heet een **normale stochast**. Je spreekt ook wel van een **normale kansverdeling** die bestaat uit kansen van de vorm

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

De GR kan dergelijke kansen rechtstreeks berekenen. Ook kan hij het bijbehorende gebied voor je schaduwen.



Figuur 5

De bijbehorende vuistregels vind je in [Statistiek, Uitspraken doen](#).

Voorbeeld 1

Bekijk de applet: Normale verdeling


De lengte L van een groep soldaten is normaal verdeeld met een gemiddelde van $\mu = \bar{L} = 182$ cm en een standaarddeviatie van $\sigma = 7$ cm.

Bereken $P(167 < L < 180)$, $P(L < 180)$, $P(L = 180)$ en $P(L > 180)$.

Antwoord

Al deze kansen zijn met de GR gemakkelijk te vinden, zie ook het [Practicum](#).

- $P(170 < L < 180) \approx 0,3443$
- $P(L < 180) \approx 0,3875$
- $P(L = 180) = 0$
- $P(L > 180) = 1 - P(L < 180) \approx 0,6125$



Figuur 6

Opgave 3

In [Voorbeeld 1](#) zie je nog eens hoe je bij de lengteverdeling van de soldaten kansen berekend uitgaande van een normale verdeling als model.

- Wat betekent $P(162 < L < 178)$ in dit verband?
- Hoeveel procent van de soldaten heeft een lengte tussen 171 en 178 cm?
- Hoeveel procent van de soldaten heeft een lengte van precies 171 cm?

Bij deze laatste vraag ben je hopelijk een probleem tegengekomen dat bij het werken met normale verdelingen een rol speelt. De gegevens van de soldaten zijn op hele lengtes afgerond. Als je dus vraagt naar het percentage soldaten met een lengte van precies 171 cm, dan moet je goed afspreken wat je bedoelt: echt precies 171 cm, of afgerond 171 cm.

- Wat is het antwoord op c wanneer je wilt weten hoeveel procent van de soldaten een lengte heeft van afgerond 171 cm?
- Wat betekent dit afrondingsprobleem voor het antwoord op b?
Vanaf nu moet je de afspraak hanteren dat je bij een normale verdelingen geen rekening houdt met afrondingen, tenzij duidelijk in de vraagstelling naar voren komt dat dit moet. Dit betekent dat $P(162 < L < 178) = P(162 \leq L < 178) = P(162 < L \leq 178) = P(162 \leq L \leq 178)$.
- Hoeveel procent van de soldaten van deze kazerne heeft een lengte van minder dan 158 cm?
- Hoeveel procent van de soldaten van deze kazerne heeft een lengte vanaf $\mu - 1,5 \cdot \sigma$ t/m $\mu + 1,5 \cdot \sigma$?

Voorbeeld 2

Het gewicht G van een bepaalde soort appels is normaal verdeeld met een gemiddeld van 150 gram en een standaarddeviatie van 17 gram. Hoeveel procent van deze appels weegt meer dan 160 gram?

Antwoord

Deze vraag kun je vertalen naar: "Bereken $P(G > 160 | \mu = 150 \text{ en } \sigma = 17)$."

Met je GR vind je: $P(G > 160 | \mu = 150 \text{ en } \sigma = 17) \approx 0,2781$.

En dus is ongeveer 28% van deze appels zwaarder dan 160 gram.

Opgave 4

Het gewicht G van een bepaalde soort appels is normaal verdeeld met een gemiddeld van 150 gram en een standaarddeviatie van 17 gram. Bekijk eventueel [Voorbeeld 2](#).

- Hoe groot is de kans dat een appel van deze soort minder dan 140 gram weegt?
- Hoeveel procent van deze appels heeft een gewicht dat minder dan 10 afwijkt van het gemiddelde?
- Een groenteboer heeft nog 340 van die appels. Hoeveel daarvan zijn lichter dan 120 gram?

Opgave 5

Bioloog Peter Adriaanse heeft van 1000 koolwitjes de spanwijdte van de vleugels gemeten. Hij vond dat deze spanwijdte ongeveer normaal is verdeeld met een gemiddelde van 5,2 cm en een standaardafwijking van 0,8 cm.

- Hoeveel procent van de gemeten koolwitjes had een spanwijdte van meer dan 6 cm?
- Hoeveel van de gemeten koolwitjes hadden een spanwijdte tussen de 5 en de 6 cm?
- Hoe groot is de kans op een koolwitje met een spanwijdte van minstens 6,5 cm?



Figuur 7

Voorbeeld 3

Bekijk de applet: Normale verdeling

De lengte L van een groep soldaten is normaal verdeeld met een gemiddelde van $\mu(L) = 182$ cm en een standaarddeviatie van $\sigma(L) = 7$ cm.


Welke lengtes kunnen de 20% langste mensen in deze groep aannemen?

Antwoord

Deze vraag kun je vertalen in:


Bereken grenswaarde g als $P(L > g) = 0,20$.

De grafische rekenmachine heeft hiervoor een speciale functie ingebouwd gekregen. Die stelt je in staat om vanuit een gegeven kans de grenswaarde terug te vinden. Alleen is die functie wel ingesteld op 'kleiner-of-gelijk'-kansen.



Figuur 8

Omdat $P(L > g) = 0,20$ betekent dat $P(L < g) = 1 - P(L > g) = 0,80$ kun je die functie hier toch gebruiken.
 Je vindt: $g = 187,9$.
 De 20% langste mensen zijn 187,9 cm of langer.



Figuur 9

Opgave 6

In **Voorbeeld 3** zie je hoe je met de rekenmachine bij gegeven kansen de grenswaarde kunt terugvinden.

- a Voer zelf de berekening in dit voorbeeld uit.
- b Hoe lang zijn de 20% kleinste soldaten op zijn hoogst?
- c 10% van de soldaten zit boven het gemiddelde maar is toch niet langer dan a cm. Bereken a .

Opgave 7

Ga nog eens uit van de normaal verdeelde lengtes van de soldaten in een bepaalde kazerne. De gemiddelde lengte is 182 cm en de standaardafwijking is 7. Men besluit voor deze 1200 soldaten T-shirts aan te schaffen in drie maten: S (small), M (medium) en L (large). Deze maten worden zo gemaakt dat elke maat precies voor $\frac{1}{3}$ deel van de soldaten geschikt is.

- a Voor welke lengtes is maat S geschikt?
- b Voor welke lengtes is maat M geschikt?

Verwerken

Opgave 8

In een fabriek worden kilopakken suiker machinaal gevuld. Volgens de Europese norm mag niet meer dan 2,5% van de pakken suiker minder dan 1000 gram bevatten, maar deze fabriek lijkt hier niet aan te voldoen.

Bekijk de vulgewichten van een steekproef van dertig pakken suiker uit deze fabriek.

998,3	994,9	1003,5	999,6	1001,0	1001,1
997,9	1003,0	999,5	999,4	991,7	998,0
1001,8	997,8	999,3	995,1	1000,0	998,8
996,3	999,9	999,5	998,6	999,0	1001,5
1000,8	1001,4	998,1	997,5	995,3	998,2

Tabel 1

- a Hoeveel procent van deze pakken suiker is lichter dan 1000 gram?
- b Maak een histogram van de vulgewichten uit de tabel. Gebruik klassen met een klassenbreedte van 1 gram. Laat zien dat de fabrikant met een beetje goede wil kan beargumenteren dat de vulgewichten van deze machine bij benadering een symmetrische klokvormige verdeling hebben.
- c Bereken het gemiddelde en de standaardafwijking van deze vulgewichten tot op één decimaal nauwkeurig.

De steekproef wordt als representatief voor alle pakken suiker uit deze fabriek beschouwd. Op grond van het berekende gemiddelde en de berekende standaardafwijking wordt verondersteld dat het gewicht van de pakken suiker uit deze fabriek normaal is verdeeld.

- d Hoeveel procent van al zijn pakken is dan te licht?

Opgave 9

Aan een examen wiskunde A nemen 20000 kandidaten deel. De resultaten zijn ongeveer normaal verdeeld. Het gemiddelde cijfer is 6,4 en de standaardafwijking 1,1

- a Hoeveel kandidaten hebben een cijfer onder de 5,5, dus een onvoldoende?
- b Hoeveel kandidaten hebben minstens een 7,0?
- c Hoeveel kandidaten hebben hoogstens een 4,0?


Opgave 10

Het vulvolume V van een pak melk is normaal verdeeld met een gemiddelde van 1,02 liter en een standaardafwijking van 0,015 liter. De consument verwacht 1 liter melk te kopen.

- a Hoeveel procent van de melkpakken bevat minder dan 1 liter melk?
- b Hoeveel procent van de melkpakken bevat meer dan 1,03 liter melk?
- c Je koopt zo'n melkpak. Hoe groot is de kans dat er 2 centiliter te weinig melk in je pak zit?
- d Je kunt niet bepalen hoeveel procent van de melkpakken een inhoud van precies 1 liter heeft. Je kunt wel bepalen hoeveel procent van de melkpakken afgerond op twee decimalen 1 liter bevat. Dan zie je dat het gaat om het gebied vanaf de grens 0,995 tot de grens 1,005. En daar hoort wel degelijk een bepaald percentage bij. Bereken dat percentage.
- e 5% van de melkpakken heeft een vulvolume van minder dan g . Bereken g .
- f Hoeveel liter melk bevat een melkpak dat hoort bij de volste 10%?

Opgave 11

Volgens het onderzoek van Freudenthal en Sittig uit 1947 waren de lengtes van vrouwen die bij de Bijenkorf winkelden normaal verdeeld met een gemiddelde van 162 cm en een standaarddeviatie van 6,5 cm. Ga bij het beantwoorden van de onderstaande vragen steeds uit van die normale verdeling als model voor de lichaamslengte van deze 5001 vrouwen.



Figuur 10

- a Hoeveel procent van deze vrouwen was langer dan 170 cm?
- b Hoeveel procent van deze vrouwen had een lengte tussen 160 en 170 cm?
- c Hoe groot is de kans dat een vrouw die je toen bij de Bijenkorf tegen kon komen 160 cm lang was? (Neem aan dat alle lengtes op gehele cm zijn afgerond.)
- d Hoe lang waren de 10% kleinste vrouwen?
- e En hoe lang waren de 10% langste vrouwen?

Opgave 12

Open het bestand [Enkele lichaamsafmetingen van 5001 vrouwen uit 1947](#).

Hierin zie je een tabel met kniehoogtes in cm van de 5001 vrouwen uit het onderzoek in 1947 van Freudenthal en Sittig in opdracht van De Bijenkorf.

- a Bereken met de computer de gemiddelde kniehoogte en de standaarddeviatie.

- b** Teken een histogram en benader dit met een normaalkromme waarin je beide waarden aangeeft. Neem nu verder aan dat de kniehoogte K van vrouwen normaal is verdeeld met de eerder berekende waarden voor het gemiddelde μ en de standaarddeviatie σ .
- c** 90% van de kniehoogtes zit tussen $\mu - a$ en $\mu + a$. Hoe groot is a ?
- d** Welke minimale lengte hebben de 20% grootste kniehoogtes?

Toepassen

Opgave 13: Leeftijdsgroepen vergelijken

Van twee leeftijdsgroepen zijn de scores voor een test verzameld. De scores van beide groepen zijn bij benadering normaal verdeeld. Bekijk de gemiddelden en de standaardafwijkingen in het overzicht.


	12-jarigen	16-jarigen
aantal tests	500	800
μ	48	56
σ	8	12

Tabel 2

- a** Hoe groot ongeveer is de kans dat een 12-jarige beter scoorde dan gemiddeld een 16-jarige?
- b** Hoe groot is de kans dat in een groep van 25 willekeurige 12-jarigen er hoogstens één is die beter scoorde dan gemiddeld een 16-jarige?
Rond af op gehele procenten (vanwege de schatting).
- c** Schets de twee bijbehorende normaalkrommen. Zijn ze even hoog? Zo nee, welke reikt hoger?

Opgave 14: Levensduur van lampen

Van twee soorten lampen is de levensduur van 500 exemplaren gemeten. Het aantal branduren blijkt vrijwel normaal verdeeld te zijn. Hier zie je de bijpassende normaalkrommen. Enkele percentages zijn gegeven.



Figuur 11

Van soort A is het gemiddelde $\mu_A = 600$ branduren en de standaardafwijking $\sigma_A = 20$ uur.

- a** Hoeveel procent van de lampen van soort A brandt minder dan 600 uur?
- b** Hoeveel procent van de lampen van soort A brandt minder dan 620 uur?
- c** Hoeveel is het gemiddelde aantal branduren van de lampen van soort B? En hoeveel is de standaardafwijking van de lampen van soort B?
Beargumenteer je antwoord.
- d** Waarom heeft de normale verdeling bij soort B een top die minder hoog is dan die van de normale verdeling van soort A?

Testen

Opgave 15

Een zakje Cup-a-Soup moet 17 g bevatten. Het gewicht van zakjes is normaal verdeeld. De vulmachine is zo ingesteld dat het vulgewicht 19 g bedraagt met een standaardafwijking van 1,5 g. Het vulgewicht komt overeen met het gemiddelde gewicht.

- Hoe groot is de kans dat een zakje minder dan 17 g weegt?
- Hoe groot is de kans dat een zakje Cup-a-Soup meer dan 17 g weegt?
- Hoeveel weegt 90% van deze zakjes op zijn hoogst?
- Hoeveel weegt 90% van deze zakjes op zijn minst?



Figuur 12

Opgave 16

Bij een groep van 1000 mannen is de bloeddruk normaal verdeeld met een gemiddelde van 128,5 mm Hg met een standaardafwijking van 12,5 mm Hg.

- Hoeveel mannen hebben een bloeddruk die meer dan drie keer de standaardafwijking afwijkt van de gemiddelde bloeddruk?
- Hoeveel procent van de mannen heeft een bloeddruk van meer dan 150?
- Hoeveel bedraagt de bloeddruk van de 10% mannen met de hoogste bloeddruk?

Practicum

Met de volgende practica kun je zien hoe je **normale kansen berekent met de grafische rekenmachine**. Doe alleen de onderdelen die betrekking hebben op de normale verdeling.

- [Kansverdelingen met de TI84](#)
- [Kansverdelingen met de TIinspire](#)
- [Kansverdelingen met de Casio fx-CG50](#)
- [Kansverdelingen met de HP-prime](#)
- [Kansverdelingen met de NumWorks](#)

Bekijk het practicum [Normale verdeling](#) als je met Excel-2013 of Excel-2016 werkt. Ook voor oudere versies van Excel zijn er nog practica. Aan de nieuwste versie wordt gewerkt.



© 2022

Deze paragraaf is een onderdeel van het Math4All wiskundemateriaal.

Math4All stelt het op prijs als onvolkomenheden in het materiaal worden gemeld en ideeën voor verbeteringen in de content of dienstverlening kenbaar worden gemaakt.

Email: f.spijkers@math4all.nl

Met de Math4All maatwerkdienst kunnen complete readers worden samengesteld en toetsen worden gegenereerd. Docenten kunnen bij a.f.otten@xs4all.nl een gratis inlog voor de maatwerkdienst aanvragen.
